
INNOAESTHETICS
Innovation from Experience

FICHA TÉCNICA

Línea: INNO-TDS®



Producto: Face Nade

Indicación: Redefinición del contorno facial.

Acción:
El producto se caracteriza por perfilar el volumen del tejido adiposo facial para conseguir una mayor definición de la estructura y mejorar los contornos, proporcionando una imagen más armónica y equilibrada.


Mecanismo de acción:
Combinación de activos que actúa favoreciendo la lipólisis de los adipocitos localizados en el rostro e inhibiendo la lipogénesis, a la vez que mejora el drenaje linfático y refuerza la estructura cutánea.

pH del producto: 7.0 - 8.0

Osmolaridad: 260-340 mOsmol/Kg

Áreas de Aplicación

- Doble mentón.
- Mejillas.
- Área yugal.



Protocolo de tratamiento: Realizar 1 sesión cada 7 días por un total de 4 aplicaciones lo que completaría un ciclo de tratamiento. Este ciclo puede repetirse cada 6 meses, o cuándo el profesional lo considere necesario.

Protocolo de aplicación: Administrar 2,5 mililitros utilizando una técnica de liberación transdérmica.

Principios activos y propiedades:

- **Carnitina:** favorece el transporte de ácidos grasos al interior de las mitocondrias transformándola en energía. Modula el metabolismo lipídico al estimular la lipólisis y la β oxidación, acompañada de los cambios correspondientes en la expresión genética y, en la expresión y supresión de genes adipogénicos.

- **Cynara:** favorece la eliminación de líquidos mejorando el drenaje linfático. A nivel metabólico, la Cynarina favorece la síntesis de coenzimas NADP-NADPH2 que intervienen en la síntesis de ácidos grasos.

- **Melilotus:** antiedematoso, mejora la cinética linfática. Sus activos aumentan la resistencia y el tono de las venas, reduciendo así la fragilidad y permeabilidad de los capilares.

- **Tirosina:** estimula la actividad metabólica del adipocito.

- **Lecitina:** emulsionante de grasas

- **Troxerutina:** Reduce la permeabilidad capilar lo que se traduce en una disminución de los edemas.

Presentación: Caja con 4 viales de 2.5 ml.

Bibliografía:

Fintelmann, V. -1996- Therapeutic profile and mechanism of action of artichoke leaf extract: hypolipemic, antioxidant, hepatoprotective and choleretic properties. Phytomed. Suppl 1: 50.
Zapolska-Downar D, Zapolski-Downar A, Naruszewicz M, Siennicka A, Krasnode¸bska B & Kolodziej B (2002) Protective properties of artichoke (Cynara scolymus) against ossidative stress induced in cultured endothelial cells and monocytes. Life Sci 71, 2897–2908.
Mak-Soon Lee. L-Carnitine stimulates lipolysis via induction of the lipolytic gene expression and suppression suppression of the adipogenic gene expression in 3T3-L1 adipocytes. J Med Food 2006; 9(4): 468-473.
Ramsay, R.P.; Arduni, A. The carnitina acyltransferases and their role in modulating acyl-CoA polls. Arch. Biochem. Biophys; 302:307-314, 1993.
Kalaiselvi T., Panneerselvam C. Effect of L carnitine on the status of lipid peroxidation and antioxidants. J. Nutr. Biochem. 9:575-581. 1998
Rruneton, J. Elementos de fitoquímica y farmacognosia. Ed, Acribia, Zaragoza, 1991, págs.65- 1 66.
Botta, B., Vitali, A., Menendez, P., Misiti, D., Delle Monache, L. Prenylated flavonoids: pharmacology and biotechnology. Current Medicinal Chemistry 2005, 12, 713-739.
Marinello Roura J. Gesto Castromil R. Patología venosa. Guía de diagnóstico y tratamiento del Capítulo Español de Flebología.
Bonet Monné S. Evidencias de efectividad de los flebotónicos en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. FMC. 2003;10:711-9.